


Mérous / *Epinephelinae* sp.



A - IMMATURE

GONADES
TRANSPARENTES À
TRANSLUCIDES

SANS ŒUFS



B - EN DÉVELOPPEMENT

GONADES OPAQUES

œufs non hydratés
PARFOIS visibles



C - EN PONTE

AU MOINS 1 ŒUF
HYDRATÉ VISIBLE




D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION

Aspect général
"rabougré"

GONADES FLASQUES
et PAROI ÉPAISSE

QUEQUES ŒUFS
HYDRATÉS ENCORE
PRÉSENTS



Mérus / *Epinephelinae* sp.



E - OMISSION DE PONTE

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

F - ANORMAL

GONADES
NÉCROSÉES,
SCLÉROSÉES ou
INTERSEXUÉES




Photo	Sexe	Espèces	Taille de 1ère maturité
		Cephalopholis fulva	NA
		Epinephelus guttatus	NA
		Epinephelus striatus	NA

Références/Photos :

CIEM (WKASMSF 2018 & WKMATCH 2012),
IFREMER,

Quéro J-C. et Vayne J-J.2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304

© J. Baudrier - Ifremer Martinique