

**Baudroie / *Lophius sp.***




**A - IMMATURE**

GONADES "APPLATIES"

GONADES TRANSPARENTES À TRANSLUCIDES


SANS ŒUFS



**B - EN DÉVELOPPEMENT**

Gonades se remplissent et deviennent opaques

œufs non hydratés PARFOIS visibles



**C - EN PONTE**

AU MOINS 1 ŒUF HYDRATÉ VISIBLE



**D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION**

Aspect général "rabougri"

GONADES FLASQUES et PAROI ÉPAISSE

Parfois qq œufs hydratés encore présents



Baudroie / *Lophius sp.*



**E - OMISSION DE PONTE**

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

**F - ANORMAL**

GONADES  
NÉCROSÉES,  
SCLÉROSÉES ou  
INTERSEXUÉES



Photo	Sexe	Espèces	Taille de 1ère maturité
		Lophius piscatorius	31 - 58 cm
		Lophius budegassa	24 - 43 cm

**Références/Photos :**

CIEM (WKASMSF 2018 & WKMATCH 2012),  
IFREMER,

Quéro J-C. et Vayne J-J.2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304

© J. Baudrier - Ifremer Martinique