

Baudroie / *Lophius sp.*



A - IMMATURE

GONADES
"ARRONDIES"

GONADES
TRANSPARENTES À
TRANSLUCIDES



B - EN DÉVELOPPEMENT

Gonades se remplissent
et deviennent opaques



NON FLUANT



C - EN PONTE

FLUANT

OPAQUES ET
BLANCHÂTRES



D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION

GONADES FLASQUES
RÉSIDUS DE
LAITANCE

SANG DANS LES
TISSUS



Baudroie / *Lophius sp.***E - OMISSION DE PONTE**

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

F - ANORMALGONADES
NÉCROSÉES,
SCLÉROSÉES ou
INTERSEXUÉES**NA**

Pas de données photos

**NA**

Pas de données photos



Photo	Sexe	Espèces	Taille de 1ère maturité
		<i>Lophius piscatorius</i>	30 - 52 cm
		<i>Lophius budegassa</i>	25 - 39 cm

Références/Photos :

CIEM (WKASMSF 2018 & WKMATCH 2012),
IFREMER,

Quéro J-C. et Vayne J-J. 2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304

© J. Baudrier - Ifremer Martinique