

# Barbue & Turbot / *Scophthalmus sp.*



## A - IMMATURE

GONADES  
TRANSPARENTES À  
TRANSLUCIDES

SANS ŒUFS



## B - EN DÉVELOPPEMENT

GONADES OPAQUES

œufs non hydratés  
PARFOIS visibles



## C - EN PONTE

AU MOINS 1 ŒUF  
HYDRATÉ VISIBLE




## D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION

Aspect général  
"rabougré"

GONADES FLASQUES  
et PAROI ÉPAISSE

QUEQUES ŒUFS  
HYDRATÉS ENCORE  
PRÉSENTS



Barbue & Turbot / *Scophthalmus sp.*



**E - OMISSION DE PONTE**

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

**F - ANORMAL**

GONADES  
NÉCROSÉES,  
SCLÉROSÉES ou  
INTERSEXUÉES



Photo	Sexe	Espèces	Taille de 1ère maturité
		Scophthalmus rhombus	31 - 32 cm
		Scophthalmus maximus	34 - 45 cm

**Références/Photos :**

CIEM (WKASMSF 2018 & WKMATCH 2012),  
IFREMER,

Quéro J-C. et Vayne J-J.2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304

© J. Baudrier - Ifremer Martinique